




तिळ



अ . क्र.	तपशिल	
१.	पीक /वाणाचे नाव	तीळ ए के टी -१०१
२.	प्रसारित केल्याचे वर्ष	२००१
३.	प्रसारित करणारी संस्था / विद्यापीठ	डॉ. पं.दे.कृ.वि. अकोला
४.	जमीन	मध्यम ते हलकी जमीन उपयुक्त ठरते
५.	हवामान	समशितोष्ण हवामान उपयुक्त
६.	पेरणी / लागवडीचा कालावधी	फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा
७.	प्रती एकर बियाणे	१ ते १.५ कि.
८.	पीक व्यवस्थापन	
अ	लागवडीचे / पेरणीचे व्यवस्थापन	बियाणे फार बारीक असल्यामुळे यात समप्रमाणात वाळु/गाळलेले शेणखत/राख /माती मिसळावी. पाभरीने /तिफनीने ३० सें.मी. अंतरावर पेरणी करावी.
ब	खत व्यवस्थापन	२५ :२५ कि. नत्र व स्फुरद व २० कि. झिंक व सल्फर प्रति हेक्टरी द्यावे. नत्राची अर्धी मात्रा पेरणीच्या वेळी व अर्धीमात्रा ३० दिवसांनी द्यावी.
क	पाणी व्यवस्थापन	उन्हाळी पिकास/ अर्ध खी पिकास पेरणीपूर्वी व पेरणीनंतर ताबडतोड व नंतर जमीनीच्या मगदुराप्रमाणे १२ ते १५ दिवसांनी ओलीत करावे. फुलो-यास सुरवात होतांना व बोंड्या भरतांना ताण पडल्यास संरक्षक ओलीत द्यावे.
ड	कीड व्यवस्थापन	गादमाशी व बोंडे पोखरणारी अळी : क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २०मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
इ	रोग व्यवस्थापन	मर व खोड/मुळकुजव्या : बिज प्रक्रिया थायरम ३ ग्रॅम किंवा



		<p>ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी ४ ग्रॅम या प्रमाणात बियाण्यास चोळावे.</p> <p><b>भुरी रोग</b> : ३०० मेस गंधक २० किलो प्रति हेक्टरी वारा शंत असतांना धुरळावे किंवा पाण्यात मिसळणारे गंधक २५ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p> <p><b>पर्णगुच्छ</b> : रोग पसरवणा-या तुडतुडयांच्या नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २०मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p>
९.	पिकाचा कालावधी	८५-९२ दिवस
१०.	उत्पादकता	७.५० -८.५० क्वि/हे.
११.	वाणाची वैशिष्ट्ये /विशेष गुणधर्म	<ul style="list-style-type: none"> <li>तेलाचे प्रमाण ४८-४९ %</li> <li>पर्णगुच्छ, अणुजीवी टिपके व मूळ कुजव्या यास प्रतिकारक</li> </ul>
१२	वाणा संबंधी छायाचित्रे	



अ . क्र.	तपशिल	
१.	पीक /वाणाचे नाव	तीळ - पि के व्ही एन टी -११
२.	प्रसारित केल्याचे वर्ष	२००९
३.	प्रसारित करणारी संस्था / विद्यापीठ	डॉ. पं.दे.कृ.वि. अकोला
४.	जमीन	मध्यम ते हलकी जमीन उपयुक्त
५.	हवामान	समशितोष्ण हवामान उपयुक्त
६.	पेरणी / लागवडीचा कालावधी	फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा
७.	प्रती एकर बियाणे	१ ते १.५ कि.
८.	पीक व्यवस्थापन	
अ	लागवडीचे / पेरणीचे व्यवस्थापन	बियाणे फार बारीक असल्यामुळे यात समप्रमाणात वाळु/गाळलेले शेणखत/राख /माती मिसळावी. पाभरीने /तिफनीने ३० सें.मी. अंतरावर पेरणी करावी.
ब	खत व्यवस्थापन	२५ :२५ कि. नत्र व स्फुरद व २० कि. झिंक व सल्फर प्रति हेक्टरी द्यावे. नत्राची अर्धी मात्रा पेरणीच्या वेळी व अर्धीमात्रा ३० दिवसांनी द्यावी.
क	पाणी व्यवस्थापन	उन्हाळी पिकास/ अर्ध रबी पिकास पेरणीपूर्वी व पेरणीनंतर ताबडतोड व नंतर जमीनीच्या मगदुराप्रमाणे १२ ते १५ दिवसांनी ओलीत करावे. फुलो-यास सुरवात होतांना व बोंडया भरतांना ताण पडल्यास संरक्षक ओलीत द्यावे.
ड	कीड व्यवस्थापन	गादमाशी व बोंडे पोखरणारी अळी : क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २०मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
इ	रोग व्यवस्थापन	मर व खोड/मुळकुजव्या : बिज प्रक्रिया थायरम ३ ग्रॅम



		<p>किंवा ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी ४ ग्रॅम या प्रमाणात बियाण्यास चोळावे.</p> <p><b>भुरी रोग :</b> ३०० मेस गंधक २० किलो प्रति हेक्टरी वारा शंत असतांना धुरळावे किंवा पाण्यात मिसळणारे गंधक २५ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p> <p><b>पर्णगुच्छ :</b> रोग पसरवणा-या तुडतुड्यांच्या नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २० मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p>
९.	पिकाचा कालावधी	८६-१०९ दिवस
१०.	उत्पादकता	६-८ क्विं/हे.
११.	वाणाची वैशिष्टे /विशेष गुणधर्म	<ul style="list-style-type: none"> <li>• तेलाचे प्रमाण ४८-५४ %</li> <li>• पर्णगुच्छ यास प्रतिकारक तसेच मूळ कुजव्या, अणुजीवी टिपके आणि पाने गुंडाळणारी अळी आणि बोंडया पोखरणारी अळी यास काही प्रमाणात बळी पडते.</li> </ul>
१२	वाणा संबंधी छायाचित्रे	


अनु . क्र.	तपशिल
---------------	-------

# डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला



१.	पीक /वाणाचे नाव	तीळ - ए के टी - ६४
२.	प्रसारित केल्याचे वर्ष	१९९६
३.	प्रसारित करणारी संस्था / विद्यापीठ	डॉ. पं.दे.कृ.वि. अकोला
४.	जमीन	मध्यम ते हलकी जमीन उपयुक्त
५.	हवामान	समशितोष्ण हवामान उपयुक्त
६.	पेरणी / लागवडीचा कालावधी	खरीप जूनचा शेवटचा आठवडा ते जुलैचा पहिला आठवडा
७.	प्रती एकर बियाणे	कि १ ते १.५ कि.
८.	पीक व्यवस्थापन	
अ	लागवडीचे / पेरणीचे व्यवस्थापन	बियाणे फार बारीक असल्यामुळे यात समप्रमाणात वाळु/गाळलेले शेणखत/राख /माती मिसळावी. पाभरीने /तिफनीने ३० सें.मी. अंतरावर पेरणी करावी.
ब	खत व्यवस्थापन	४०:२५ कि. नत्र व स्फुरद व २० कि. झिंक व सल्फर प्रति हेक्टरी द्यावे. नत्राची अर्धी मात्रा पेरणीच्या वेळी व अर्धीमात्रा ३० दिवसांनी द्यावी.
क	पाणी व्यवस्थापन	उन्हाळी पिकास/ अर्ध रबी पिकास पेरणीपूर्वी व पेरणीनंतर ताबडतोड व नंतर जमीनीच्या मगदुराप्रमाणे १२ ते १५ दिवसांनी ओलीत करावे. फुलो-यास सुरवात होतांना व बोंडया भरतांना ताण पडल्यास संरक्षक ओलीत द्यावे.
ड	कीड व्यवस्थापन	गादमाशी व बोंडे पोखरणारी अळी : क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २०मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
इ	रोग व्यवस्थापन	मर व खोड/मुळकुजव्या : बिज प्रक्रिया थायरम ३ ग्रॅम किंवा ट्रायकोडर्मा दिरीडी ४ ग्रॅम या प्रमाणात बियाण्यास चोळावे. भुरी रोग : ३०० मेस गंधक २० किलो प्रति हेक्टरी वारा



		शंत असतांना धुरळावे किंवा पाण्यात मिसळणारे गंधक २५ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. <b>पर्णगुच्छ</b> : रोग पसरवणा-या तुडतुडयांच्या नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २०मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
९.	पिकाचा कालावधी	९०-९५ दिवस
१०.	उत्पादकता	५.५ ते ६.५ क्वि/हे.
११.	वाणाची वैशिष्ट्ये /विशेष गुणधर्म	<ul style="list-style-type: none"> <li>तेलाचे प्रमाण ४६ - ५० %</li> <li>अणुजीवी ठिपके, मूळ कुजव्या व खोड कुजव्या यास प्रतिकारक</li> </ul>
१२.	वाणा संबंधी छायाचित्रे	

अनु क्र.	तपशिल	
१.	पीक /वाणाचे नाव	तीळ- एन-८
२.	प्रसारित केल्याचे वर्ष	१९८१
३.	प्रसारित करणारी संस्था /विद्यापीठ	डॉ. पं.दे.कृ.वि. अकोला
४.	जमीन	मध्यम ते हलकी जमीन उपयुक्त



५.	हवामान	समशितोष्ण हवामान उपयुक्त
६.	पेरणी / लागवडीचा कालावधी	अर्ध रब्बी सप्टेंबरचा पहिला पंधरवडा
७.	प्रती एकर बियाणे	१ ते १.५ कि.
८.	पीक व्यवस्थापन	
अ	लागवडीचे / पेरणीचे व्यवस्थापन	बियाणे फार बारीक असल्यामुळे यात समप्रमाणात वाळु/गाळलेले शेणखत/राख /माती मिसळावी. पाभरीने /तिफनीने ३० सें.मी. अंतरावर पेरणी करावी.
ब	खत व्यवस्थापन	२५ :२५ कि. नत्र व स्फुरद व २० कि. झिक व सल्फर प्रति हेक्टरी द्यावे. नत्राची अर्धी मात्रा पेरणीच्या वेळी व अर्धीमात्रा ३० दिवसांनी द्यावी.
क	पाणी व्यवस्थापन	उन्हाळी पिकास/ अर्ध रबी पिकास पेरणीपूर्वी व पेरणीनंतर ताबडतोड व नंतर जमीनीच्या मगदुराप्रमाणे १२ ते १५ दिवसांनी ओलीत करावे. फुलो-यास सुरवात होतांना व बोंडया भरतांना ताण पडल्यास संरक्षक ओलीत द्यावे.
ड	कीड व्यवस्थापन	<b>गादमाशी व बोंडे पोखरणारी अळी</b> : क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २०मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
इ	रोग व्यवस्थापन	<b>मर व खोड/मुळकुजव्या</b> : बिज प्रकिया थायरम ३ ग्रॅम किंवा ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी ४ ग्रॅम या प्रमाणात बियाण्यास चोळावे. <b>भुरी रोग</b> : ३०० मेस गंधक २० किलो प्रति हेक्टरी वारा शंत असतांना धुरळावे किंवा पाण्यात मिसळणारे गंधक २५ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. <b>पर्णगुच्छ</b> : रोग पसरवणा-या तुडतुडयांच्या नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ प्रवाही २०मि.ली. किंवा कार्बारील १० टक्के पा.मि.भु. ४० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.





९.	पिकाचा कालावधी	१२५ दिवस
१०.	उत्पादकता	६ ते ६.५ क्विं/हे.
११.	वाणाची वैशिष्ट्ये /विशेष गुणधर्म	<ul style="list-style-type: none"><li>• तेलाचे प्रमाण ५० - ५१ %</li><li>• मर अणुजीवी ठिपके, भुरी रोग, पर्णगुच्छ, मूळ कुजव्या व खोड कुजव्या यास प्रतिकारक</li></ul>
१२.	वाणा संबंधी छायाचित्रे	